RESULTADOS

- Tabla1. Frecuencia de estiramientos abdominales presentados por los ratones administrados en cada equipo de trabajo

Dosis	5 min	10 min	15 min	20 min	Promedio	e.s.
Solución salina 0.9%						
Diclofenaco 1.0 mg/kg						
Diclofenaco 3.0 mg/kg						
Diclofenaco 10.0 mg/kg						
Diclofenaco 30.0 mg/kg						

RESULTADOS

- Los resultados obtenidos por cada equipo se conjuntarán en una tabla general .
- Graficar:
  - El promedio de los estiramientos obtenidos de todos los grupos con solución salina o diclofenaco 1.0, 3.0. 10.0 y 30.0 mg/Kg contra el tiempo de registro.
  - Hacer gráfica de barras del promedio de frecuencia de estiramientos del grupo control y de cada uno de los grupos con cada una de las dosis administradas de diclofenaco.
  - Compare estadísticamente los resultados obtenidos
  - Calcular la dosis efectiva 50 del diclofenaco, por medio del método de área bajo la curva



Curso temporal de la frecuencia de estiramientos en función del tiempo del grupo control y de cada grupo adminsitrado con cada dosis de diclofenaco ...



Discusión y Conclusiones

- 1. Compare los resultados obtenidos con respecto a los reportados en la bibliografía
- 2. Comente los resultados obtenidos, teniendo en cuenta la fisiopatología del modelo de dolor usado en la práctica
- 3. Confirme o rechace las hipótesis elaboradas durante el desarrollo de la práctica
- 4. Concluya de acuerdo a la experiencia obtenida en esta práctica de Farmacología Preclínica.